

Leitfragen zu möglichen Symptomen von Mukopolysaccharidose Typ I



Ab 2 Jahre

- ☐ Ist das Kind zu klein für das Alter oder auffällig kleiner als die Altersgenossen?
- ☐ Hat das Kind krumme Fingerspitzen oder steife Gelenke?
- ☐ Hat das Kind z.B. Probleme beim Pullover über den Kopf ziehen oder einen Ball über Kopf zu werfen?
- ☐ Hat das Kind verdickte Rachenmandeln, häufige Mittelohrentzündungen oder bereits implantierte Paukenröhrchen?
- ☐ Liegt ein Nabel- oder Leistenbruch vor?
- ☐ Hat das Kind einen vorgewölbten Bauch?
- ☐ Leidet es häufig unter Durchfällen?
- ☐ Hat das Kind grob wirkende, veränderte Gesichtszüge?
- ☐ Ist das Kind in der motorischen Entwicklung verzögert?

☒ Mit diesen Fragen werden eine Auswahl an Symptomen abgefragt, die auf MPS I hindeuten können. Können Sie mehrere Fragen mit „Ja“ beantworten, sprechen Sie Ihren Arzt auf Ihren Verdacht an. Dieser kann dann weitere diagnostische Schritte zur Abklärung einleiten.

Weitere Informationen über die Erkrankung MPS I finden Sie unter: www.lysosolutions/mps1.de



Leitfragen zu möglichen Symptomen von Mukopolysaccharidose Typ I



- ☐ Liegt ein Nabel- oder Leistenbruch vor?
- ☐ Hat das Kind Auffälligkeiten an der Wirbelsäule wie z.B. einen Buckel oder Spitzbuckel (Gibbus)?
- ☐ Hat das Kind einen auffällig groß wirkenden Kopf?
- ☐ Hat das Kind grob wirkende, veränderte Gesichtszüge?
- ☐ Hat das Kind häufige Mittelohrentzündungen oder bereits implantierte Paukenröhrchen?
- ☐ Hat das Kind auffällig häufig Atemwegsinfekte?
- ☐ Schnarcht das Kind oder schnauft es vermehrt?
- ☐ Hat das Kind einen vorgewölbten Bauch?
- ☐ Stagniert das Kind in der eigenen Entwicklung?

MAT-DE-2603443-1.0.-08/2026

☒ Mit diesen Fragen werden eine Auswahl an Symptomen abgefragt, die auf MPS I hindeuten können. Können Sie mehrere Fragen mit „Ja“ beantworten, sprechen Sie Ihren Arzt auf Ihren Verdacht an. Dieser kann dann weitere diagnostische Schritte zur Abklärung einleiten.

Weitere Informationen über die Erkrankung MPS I finden Sie unter: www.lysosolutions/mps1.de

